

你完美的关系 
是我们的目标



Elegan 美

持续36小时 勃起功能障碍治疗剂

不受进食影响
疗效持续24~36小时
迅速见效口腔崩解膜片



SEINTRIP


口腔崩解膜片(他达拉非)

10毫克 20毫克



Elegan 美

适合女性和男性使用



Mechanism of Tadalafil





通过抑制PDE-5作用，防止细胞内cGMP的分解而松弛平滑肌细胞，诱导血液的流入，增加血流量改善勃起功能障碍。

Effect on Erectile dysfunction

一日一次服用10毫克或20毫克的他达拉非即改善勃起功能，又显示良好的耐药性。

- 勃起功能障碍(ED)持续3个月以上的18岁以上患者。
- Placebo (n=54) VS. Tadalafil 5mg (n=109) qd for 12weeks VS. Tadalafil 10mg (n=105) qd for 12weeks
- The efficacy analysis included all patients, regardless of IIEF EF domain score at baseline.

* p < 0.001 versus placebo



IIEF EF : International Index of Erectile Function domain

SEP2 : Sexual Encounter Profile diary Questions 2 (successful penetration)

SEP3 : Sexual Encounter Profile diary Questions 3 (successful completion of intercourse)

GAQ : Global Assessment Question (Has the treatment you have been taking during this study improved your erections?)

勃起功能障碍(Erectile Dysfunction)

- 性生活时, 无法维持阴茎勃起
- 15~52% 男性经验勃起功能障碍
- 病原: 组织性因素-血管障碍, 神经性, 激素性, 阴茎海绵体的平滑肌异常等引起
心理性因素-无物理伤害引起勃起功能障碍的中枢性抑制

他达拉非特征

- 较快的吸收
- 不受进食影响
- 半减期为最长的治疗剂
- 疗效持续23~36小时


대한배뇨장애요심금학회
J Korea Med Assoc. (2003) 46(11), 1050-1056

Comparison of PDE5 inhibitors


他达拉非, 西地那非, 伐地那非产品都有效并提高患者的满意度。
但服用他达拉非患者具有最高的治疗疗效和满意度。

- 勃起功能障碍(ED)持续3个月以上的18岁以上患者。
- Tadalafil (n=5315) for 6 month vs. Sildenafil (n=1252) for 6 month vs. Vardenafil (n=993) for 6 month
- Precise dosage information was not collected; investigators recorded only the maximum dose of drug a patient received.

Therapeutic effectiveness



Patient satisfaction



SIQ1 : Single-item question1 (Has your erection during the past 4 weeks been insufficient to initiate or complete intercourse?)

SIQ2 : Single-item question2 (Has the treatment you have been taking in the last 4 weeks solved the problem?)

IIEF Q7 : International Index of Erectile Function question7 (intercourse satisfaction)

IIEF Q14 : International Index of Erectile Function question14 (relationship satisfaction)

EDITS Q1 : the Erectile Dysfunction Inventory of Treatment Satisfaction question1 (treatment satisfaction)



● 药物信息

产品名称	Sentrip口腔崩解膜片10毫克(他达拉非)	Sentrip口腔崩解膜片20毫克(他达拉非)
主要成分	他达拉非10毫克	他达拉非20毫克
性状	 黄色的方形口腔崩解膜片	 黄色的方形口腔崩解膜片
功能主治	勃起功能障碍(erectile dysfunction)的治疗。 需要性刺激以使本品生效。他达拉非不适合用于女性。	
用法与用量	<p>用于成年男性</p> <p>本品的推荐服药量为10mg，在进行性生活之前服用，不受进食的影响。如果服用10mg效果不显著，可以服用20mg。可至少性生活前30分钟服用。推荐的服药频率为每日一次，只需放入口腔舌上不需饮水便能自动溶解于体内易于吸收。不推荐每日服用他达拉非，由于他达拉非的疗效经常持续超过一天，且尚未确定关于长期服药的安全性。</p> <p style="text-align: right;">(详见“注意事项”和“药理毒理”)</p>	
注意事项	<p>禁用于以下患者</p> <p>1) 临床试验表明他达拉非可以增强硝酸盐类药物的降压作用。这被认为是硝酸盐类药物和他达拉非共同作用用于一氧化氮/cGMP通路的结果。因此，这个在服用任何形式的硝酸盐类药物的患者禁止服用本品。(详见“注意事项”和“药物相互作用”)</p> <p>2) 性生活会给心脏病患者带来潜在的心脏风险。因此，勃起功能障碍的治疗药物，包括他达拉非在内，不应用于建议不宜进行性生活的心脏病患者。对已患有心脏病的患者，医生应考虑性生活潜在的的心脏风险。</p> <p>3) 以进行的临床试验不包括下列心血管疾病患者，因此这些人群严禁服用他达拉非： -在最近90天以内发生过心肌梗塞 -不稳定型心绞痛或在性交过程中发生过心绞痛的患者 -在过去6个月内达到纽约心脏病协会诊断标准2级或超过2级的心衰患者 -最近6个月内发生过脑卒中患者</p> <p>4) 因遗传性退行性视网膜疾病患者，包括视网膜色素变性患者未包括在本临床试验，所以不推荐服用此药。</p> <p>5) 对他达拉非及其处方中的成分过敏的患者不得服用本品。</p> <p>6) 该药与其它勃起功能障碍药物的同时服用安全性和有效性尚未进行研究，因此不推荐同时服用其它勃起功能障碍药物。</p> <p>7) 不论先前是否服用PDE5抑制剂，如有因非动脉炎性前部缺血性视神经病变失去一只眼视力的患者禁服用此药。</p> <p style="text-align: right;">(其它详细内容参考产品说明书)</p>	
贮藏	密封，在阴凉处(1-30℃)保存。	
有效期	36个月	
包装	10枚 / 30枚	

2016.01

● 服用方法

